




Wie können Sie überprüfen, ob Ihr Kind im Alter von 12 Monaten bis 8 Jahren ausreichend gegen Kinderlähmung (Poliomyelitis) geimpft ist?

Den Impfstatus Ihres Kindes prüfen Sie anhand der Angaben im (gelben) Impfausweis. Hier finden Sie mehrere Doppelseiten, auf denen in den Spalten die Impfungen gegen verschiedene Erreger vermerkt sind. Bitte schauen Sie, wie viele Kreuze bei Poliomyelitis gemacht sind und wann diese Impfungen durchgeführt wurden.



Bildquelle: Looacid GmbH - adobe.stock.com

Kinder im Alter zwischen 12 Monate und 8 Jahren sollten mindestens 3-mal gegen Poliomyelitis geimpft worden sein, wobei der Abstand zwischen der letzten und der vorletzten Impfung mindestens 6 Monate betragen soll. In Deutschland wird nur mit dem inaktivierten Polio-Impfstoff (IPV) geimpft. Eine 3-malige Impfung bietet einen Schutz von fast 100% vor der Erkrankung.

Falls Ihr Kind nicht ausreichend geimpft ist, der Impfausweis nicht auffindbar ist oder Sie unsicher sind, vereinbaren Sie einen Termin in Ihrer Kinderarztpraxis!

Alter des Kindes: 12 Monate bis 8 Jahre

