




Wie können Sie überprüfen, ob Ihr Kind im Alter von 9 bis 17 Jahren ausreichend gegen Kinderlähmung (Poliomyelitis) geimpft ist?

Den Impfstatus Ihres Kindes prüfen Sie anhand der Angaben im (gelben) Impfausweis. Hier finden Sie mehrere Doppelseiten, auf der in den Spalten die Impfungen gegen verschiedene Erreger vermerkt sind. Bitte schauen Sie, wie viele Kreuze bei Poliomyelitis gemacht sind und wann diese Impfungen durchgeführt wurden.



Bildquelle: Loocid GmbH - adobe.stock.com

Kinder im Alter zwischen 9 und 17 Jahren sollten eine Grundimmunisierung (bestehend aus 3 bzw. 4 Impfstoffdosen) sowie eine 1-malige Auffrischimpfung erhalten haben. In Deutschland wird nur mit dem inaktivierten Polio-Impfstoff (IPV) geimpft. Die Impfung bietet einen fast 100%igen Schutz vor der Erkrankung.

Falls Ihr Kind nicht ausreichend geimpft ist, der Impfausweis nicht auffindbar ist oder falls Sie unsicher sind, vereinbaren Sie einen Termin in Ihrer Kinderarzt- oder Hausarztpraxis.

