


## Wie können Sie überprüfen, ob Sie (Erwachsene ab 18 Jahre) ausreichend gegen Kinderlähmung (Poliomyelitis) geimpft sind?

Ihren Impfstatus überprüfen Sie anhand der Angaben im (gelben) Impfausweis. Hier finden Sie mehrere Doppelseiten, auf denen in den Spalten die Impfungen gegen verschiedene Erreger vermerkt sind. Bitte schauen Sie, wie viele Kreuze bei Poliomyelitis gemacht sind und wann diese Impfungen durchgeführt wurden.



Bildquelle: Loocid GmbH - adobe.stock.com

Alle Erwachsenen sollten eine Grundimmunisierung (bestehend aus mindestens 3 Impfstoffdosen) und eine 1-malige Auffrischimpfung zum Schutz vor Poliomyelitis erhalten haben. In Deutschland wird nur mit dem inaktivierten Polio-Impfstoff (IPV) geimpft. Die Impfung bietet einen fast 100%igen Schutz vor der Erkrankung.

Falls Sie feststellen, dass Sie nicht ausreichend geimpft sind, Ihr Impfausweis nicht auffindbar ist oder falls Sie unsicher sind, vereinbaren Sie einen Termin in Ihrer Hausarztpraxis.

